


# MYR

## ZINC

Гамата MYR RANGE се основава на микроелементи и мезоелементи, в комбинация с растителни пептиди, с цел предотвратяване и/или лечение на хранителни дефицити и подобряване на добива и качеството на плодовете.

MYR RANGE гарантира най-висока ефективност и бързо усвояване, без риск от загуби поради неразтворимост. Той е резултат от внимателно изследване на механизмите на растителна абсорбция, за да се предотвратят явления на фитотоксичност, причинени от микроелементи.

Пептидите на MYR се абсорбират бързо и след това се включват в лимфата. Те могат да изпълняват функциите си в стресирани растения за няколко часа, позволявайки забележително спестяване на енергия и позволявайки възстановяването на оптималните условия за развитие.



## ПРИЛОЖЕНИЕ

| Култура         | Доза       | Приложение   |
|-----------------|------------|--|
| Царевица        | 300 мл/дка | Превантивно или при недостиг на цинк във фаза 5-6 лист                             |
| Лозя            | 300 мл/дка | Три третирания от 5-6-ти лист до цъфтеж  |
| Овощни градини  | 300 мл/дка | Против недостиг на цинк, след фаза цъфтеж  |
| Зеленчуци       | 300 мл/дка | 3 третирания, по време на вегетацията  |
| Цветя и разсади | 300 мл/дка | Против недостиг на цинк в ранен стадий на развитие<br>При нужда се пръска повторно |

Всички предоставени дози са в стандартни условия. Дозите и начините на приложение трябва да бъдат определени въз основа на изискванията и хранителния статус на културата. Препоръчваме нанасянето в най-хладните часове на деня (сутрин или вечер), за да се получи максимално усвояване от листата и най-добра ефективност. Гамата MYR може да се смесва с най-често срещаните фитосанитарни продукти и торове на пазара.

***Преди употреба препоръчваме тестване върху малка повърхност за съвместимост с други продукти.***